



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Odontología

Unidad de Posgrado

Tratamiento orto quirúrgico de mordida abierta anterior

REPORTE CLÍNICO

**Para optar el Título de Segunda Especialidad Profesional en
Cirugía Bucal y Maxilofacial**

AUTOR

Abraham Nicolas AGUILAR SANCHEZ

Lima, Perú

2012

TRATAMIENTO ORTO QUIRURGICO DE MORDIDA ABIERTA ANTERIOR

REPORTE DE CASO CLINICO

Resumen.

La mordida abierta anterior puede ser definida como una maloclusión sin contacto dentario anterior, un overbite negativo, mientras que los dientes posteriores se encuentran en oclusión céntrica.

Se presenta un caso clínico de un paciente de 18 años de edad atendido en la clínica de post grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por las especialidades de Ortodoncia y Cirugía Bucal y Maxilofacial con diagnostico de mordida abierta anterior y asimetría facial clase III . El cual después de haber pasado por un periodo de ortodoncia pre-quirúrgica es sometido a cirugía ortognática bimaxilar más mentoplastia.

Teniendo como resultado, Corrección de la mordida abierta anterior, de la asimetría facial clase III obteniendo una línea media dentaria y mentoniana coincidente con la línea media facial, Corrección del canteo maxilar, Obtención de una relación maxilo mandibular clase I, Obtención de un perfil recto, Relación canina clase I, Estabilidad en el sector posterior con una ATM. Asintomática y funcionalmente estable y una vía aérea que no se afectó negativamente.

Tratamiento que lleva 2 años de seguimiento con los resultados estables.

Palabras claves: Mordida abierta, Asimetría facial Cirugía ortognática.

ORTHO SURGICAL TREATMENT OF ANTERIOR OPEN BITE

CLINICAL CASE REPORT

Abstract:

The anterior open bite can be defined as a malocclusion without tooth contact before, a negative overbite, while the posterior teeth are in centric occlusion.

We report a case of a patient 18 years of age treated at the clinic graduate of the Universidad Nacional Mayor de San Marcos for the specialties of Orthodontics and Oral and Maxillofacial Surgery with a diagnosis of anterior open bite and Class III facial asymmetry. This after passing through a period of pre-surgical orthodontics is subjected to more mentoplasty bimaxillary orthognathic surgery.

Taking as a result, correction of anterior open bite, facial asymmetry of obtaining a Class III dental midline and chin midline coincident with the facial, maxillary canting correction, Getting a Class I maxillomandibular relationship, Getting a straight profile, class I canine relationship, Stability in the posterior with an ATM. Asymptomatic and functionally stable and an airway that is not negatively affected.

Treatment that takes 2 years of treatment with stable results.

Keywords: Open bite, facial asymmetry orthognathic surgery.